



## BIBLIOTECA TEMÁTICA

### Entrega 57

Ana de Santiago Ruiz\*

Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Centro de Cuidados Laguna, Madrid. España

Recibido el 15 de febrero de 2017  
Aceptado el 20 de febrero de 2017

Consulte en nuestra web <http://www.secpal.com/biblioteca-1> los siguientes artículos comentados:

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

#### **Evidencia de neurotoxicidad inducida por morfina o hidromorfona en fallo renal: una revisión sistemática.**

Lee KA, Ganta N, Horton JR, Chai E. Evidence for neurotoxicity due to morphine or hydromorphone use in renal impairment: a systematic review. *J Palliat Med.* 2016;19(11):1179-87.

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

#### **Predictores de delirium en pacientes con cáncer avanzado tratados con corticoides: estudio exploratorio, multicéntrico, prospectivo y observacional.**

Matsuo N, Morita T, Matsuda Y, Okamoto K, Matsumoto Y, Kaneishi K, et al. Predictors of delirium in corticosteroid-treated patients with advanced cancer: an exploratory, multicenter, prospective, observational study. *J Palliat Med.* 2017;20(4):352-9.

Comentado por Miguel Ángel Cuervo Pinna. Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos de Badajoz.

#### **Establecimiento de posición de la International Association for Hospice and Palliative Care: eutanasia y suicidio médicamente asistido.**

De Lima L, Woodruff R, Pettus K, Downing J, Buitrago R, Munyoro E, et al. International Association for Hospice and Palliative Care Position Statement: euthanasia and physician-assisted suicide. *J Palliat Med.* 2017;20(1):8-14.

#### **Dolor irruptivo y uso racional del fármaco.**

Olarte JMN. Breakthrough cancer pain and rational drug use. *Supportive Care in Cancer.* 2017;25(Suppl 1):11-7.

Comentado por María González Ascarza. Residente de Medicina Interna de 4.º año. Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz.

\*Autor para correspondencia:

Ana de Santiago Ruiz

Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Centro de Cuidados Laguna. c/ Concejal Francisco José Jiménez Martín, 128. 28047, Madrid, España

Correo electrónico: [anadsantiago@yahoo.es](mailto:anadsantiago@yahoo.es)

DOI: [10.20986/medpal.2019.1056/2019](https://doi.org/10.20986/medpal.2019.1056/2019)

1134-248X/© 2019 Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Publicado por Inspira Network. Todos los derechos reservados.

### **Intervenciones de cuidados paliativos para pacientes con insuficiencia cardiaca: una revisión sistemática y metanálisis.**

Diop MS, Rudolph JL, Zimmerman KM, Richter MA, Skarf LM. Palliative Care Interventions for patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. *J Palliat Med* 2017;20(1):84-92.

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

### **Supervivencia global entre pacientes con cáncer que precisan rotación de opioides a metadona en comparación con otros opioides.**

Reddy A, Schuler US, de la Cruz M, Yennurajalingam S, Wu J, Liu D, et al. Overall survival among cancer patients undergoing opioid rotation to methadone compared to other opioids. *J Palliat Med*. 2017;20(6):656-61.

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

### **Mayor expresión sintomática en pacientes con delirium ingresados en una unidad de cuidados paliativos agudos.**

De la Cruz M, Yennu S, Liu D, Wu J, Reddy A, Bruera E. Increased Symptom Expression among Patients with Delirium Admitted to an Acute Palliative Care Unit. *J Palliat Med*. 2017;20(6):638-41.

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

### **Metadona e intervalo QT corregido alargado en pacientes con dolor y cuidados paliativos: estudio casos-contrroles.**

Juba KM, Khadem TM, Hutchinson DJ, Brown JE. Methadone and corrected qt prolongation in pain and pallia-

tive care patients: a case-control study. *J Palliat Med*. 2017;20(7):722-8.

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

### **Lugar preferido de cuidados y fallecimiento en pacientes terminales con enfermedad cardiaca o pulmonar comparado con pacientes oncológicos.**

Skorstengaard MH, Neergaard M, Andreassen P, Science Anth C, Brogaard T, Bendstrup E, et al. Preferred place of care and death in terminally ill patients with lung and heart disease compared to cancer patients. *Journal of Palliative Medicine* 2017;20(11):1217-24.

Comentado por Claudio Calvo Espinós. Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital San Juan de Dios. Navarra.

### **La rotación opioide desde el fentanilo transdérmico a opioides fuertes en pacientes con dolor por cáncer.**

Reddy A, Yennurajalingam S, Reddy S, Wu J, Liu D, Dev R, et al. The opioid rotation ratio from transdermal fentanyl to "strong" opioids in patients with cancer pain. *J Pain Symptom Manage*. 2016;51(6):1040-5.

Comentado por Ana de Santiago Ruiz. Unidad de Cuidados Paliativos. Fundación Vianorte-Laguna. Madrid.

### **Predictores de la respuesta a corticoides para astenia por cáncer en pacientes con cáncer avanzado. Un estudio multicéntrico, prospectivo y observacional.**

Matsuo N, Morita T, Matsuda Y, Okamoto K, Matsumoto Y, Kaneishi K, et al. Predictors of responses to corticosteroids for cancer-related fatigue in advanced cancer patients: a multicenter, prospective, observational study. *J Pain Symptom Manage*. 2016;52(1):64-72.

Comentado por Ana de Santiago Ruiz. Unidad de Cuidados Paliativos. Fundación Vianorte-Laguna. Madrid.